

אוקטובר 2021

## פסילת החדר האסייתית - מזיק קשה קריה להגברת ערנות ופיקוח בפרדסי ישראל

פסילת החדר האסייתית הינה אחת משני הווקטורים (נשאים) של מחלת הגראינינג (Huanglongbing) הנגרמת ע"י החידק 'Candidatus Liberibacter' התוקף ומתפתח בצינורות השיפה של העץ. מחלת הגראינינג נחשבת לאחת ממחלות החדרים הרסניות ביותר הגורמת לנזקים כבדים לענף החדרים בברזיל ובפלורידה ומתרפעת בארה"ב ובארצות הברית הדרומית.

מקורה של פסילת החדר האסייתית בדרום מזרח אסיה אולם כבר התפשטה רבות והיא כיום מדווחת בכל דרום אסיה והגיעה עד לערב הסעודית וחדירה לכמה מדינות באפריקה. בעשור האחרון הפכה לחרק פולש חשוב באמריקה, התפשטה מרבית מדינות דרום אמריקה ומרכז אמריקה ועד למדינות הדרומיות בארה"ב.

הפסילה ניזונה ומתרפעת על צמחים מכ-25 סוגים במשפחה הפיגמיים (Rutaceae) אך בעיקר על עצי הדר ועל צמח הנווי מוריאה מכבדית (*Murraya paniculata*).

### סימני זיהוי עיקריים:

הובוגרים (2.7-3.3 מ"מ) הם חרקים קופצים/מעופפים שיכולים לעוף למרחקים קצרים בזמן הפרעה. הצעב ודגם הכנף ייחודיים ומקלים על זיהוי הדרגות הבוגרות בשטח. הכנפיים שkopoot עם פס חום כהה לאורך שליל הכנף עם "חלו" בגוון בז' בקצתו וכתמים חומים אפורים במרכז הכנף (אייר 3). הבוגרים יכולים להיות מצויים במנוחה או בהזנה עם ראשיהם בגובה פני העליה וקצת גוף ממרם ל-45° ביחס לשטח פני העליה (אייר 3).

הדרגות הצעירות (ニימפות) צהבהבות כתומות (אייר 1), מתרפתחות וניזונות רק על הלבלוב הצעיר (עלים וענפים). הן מפרישות הפרשה שעוטה לבנינה אך אין מפרישות טל דבש ולא נוצרת פיןית (אייר 2). יש להן יכולת תזוזה אך הן אינן זריזות ומצוירות במרקם שלחן כנימות רכות.

משום שמדובר במזיק הסగר שיכול לגרום לנזק הרסני לענף החדרים ובשל נוכחות המדינות מסביבנו גובר החשש לחדרה ויש צורך בהגברת ערנות ולכן אנו מפרסמים דף מידע זה.

### giloi מוקדם של פסילת החדר האסייתית עשוי להציג את ענף החדרים בישראל! ולשם לכך אנו מבקשים את עזרת הציבור

במקרה של חשד אתם מתבקשים ליצור קשר עם איתן רכט מהשירותים להגנת הצומח ולביקורת טלפון – 0503323772 ; מייל – [etanre@moag.gov.il](mailto:etanre@moag.gov.il)



David Hall  
USDA-ARS, Ft. Pierce, FL

**מידע כללי על פסילת ההדר האסייתית**

מקורה של פסילת ההדר האסייתית בdrooms מזרחה אסיה אולס מאז היא מדווחת בכל דרום אסיה עד לערב הסעודית ובכמה מדינות באפריקה. בעשור האחרון הפכה לחرك פשוט חשוב ביבשת אמריקה והתפשטה במרבית מדינות דרום אמריקה ומרכז אמריקה, ועד למיניות הדרומיות בארה"ב. הפסילה ניזונה ומתרחשת על צמחים מ-25 סוגים במשפחה הפגמיים (Rutaceae) ובעיקר על עצי הדר וצמחי מוריאה מכבדית (*Murraya paniculata*).

פסילת ההדר האסייתית היא אחד הוקטוריהם (נשאים) של מחלת הגיריניג הנגרמת ע"י החידק 'Candidatus Liberibacter' התוקף ומתפתח בצלינורות השיפה של העץ. הנחשבת לאחת ממלחמות ההדרים ההרסניות ביותר הגורמת נזק כבד לענף ההדרים בברזיל ובפלורידה ומתרחשת בארה"ב ובאמריקה הדרומית.

מחזור החיים של הפסילה כולל חמישה דרגות צעירות (איור 1). זמן דור (מבייצה לבוגר) נע בין 17-20 ימים ב- $25^{\circ}\text{C}$  ל-~50 ימים ב- $15^{\circ}\text{C}$  ומושפע גם מלחות יחסית וэмיניות לבלב צעיר שזהו המזון העיקרי הדרגות הצעירות מתרחשות וניזונות האוכלוסיות מגיעות לשיא במהלך השנה בהתאם לתקופת הלבלב. להלן המידע כפי שהוא מופיע בספרות.

**ביביצה** (איור 1 ו-2) : הביצים (0.3-0.25 מ"מ) צהבהבות ובצורת טיפה. לקרהת הבקעה צבע הווץ כתמתם. הביצים מוטלים רק בלבלב צעיר בקטוף הענפים, על שולי העלה ולאורך העורק הראשי של עליים צעירים ורכיים. נקבת פסילת ההדר מטילה כ-800 ביצים במהלך מחזור חייה. שלושה עד 10 ימים לאחר הטלה הדרגה הראשונה בוקעת מן הביצה.

הדרגות הצעירות (ニימפוֹת) צהבהבות כתומות (איור 1 ו-2), מתרחשות טל דבש ולא נוצרת פיזית אך הן מפרישות הפרשה שעשוותית לבננה. יש להן יכולת תזוזה אך הן אין זריזות ומזכירות במראה שלחן כנימות ורכות.

**הדרגה הראשונה :** 0.2-0.3 מ"מ מוארכת ולא סימני כנפיים (איור 1 תמונה 1). מהדרגה השנייה ועד החמישית הדרגות דומות והולכות וגדלות לאחר כל התנשלות (איור 1.7-1.3 מ"מ). בדרגה השנייה מופיעות רפידות הכנף (wing pads) שהולכות וגדלות בדרגות הנימפה המתקדמות יותר. בדרגה החמישית (איור 1 תמונה 5) ניתן להבחין גם במקרים שחורים ולעיתים ישנים פרטניים עם גוון יקרך בבטן.



5

4

3

2

1

איור 1 : מראה חמישת דרגות הנימפה והביצים (תמונה 2)



איור 2 : דרגות צעירות צהבהבות על קצה לבולב צעיר עם הפרשה שעוטית לבנבה אופיינית ומראה הביצים

**בוגרים (אייר 3)**: הבוגרים (2.7-3.3 מ"מ) הם חרקים קופצים/מעופפים שיכולים לעוף למרחקים קצרים בזמן הפרעה. הצבע ודגם הכנף ייחודיים ומקלים על זיהוי הדרגות הבוגרות בשטח. הכנפיים שkopoftut עם פס חום כהה לאורך שליל הכנף עם "חלון" בגוון בז' בקצתו וכתמים חומיים אפורים במרכז הכנף (אייר 3 תמונה ימנית). הבוגרים יכולים להיות מצויים במנוחה או בהזנה עם ראשיהם בגובה פני הקרקע וקצת גופם מורם ל-45° ביחס לשטח הקרקע (אייר 3 תמונה שמאלית ומרכז). בשונה מהדרגות הצעירות הבוגרים לא זוקקים לבלבול הצער על מנת לשורוד ויכולים להיזון על עליים בכל שלבי התפתחות. הם חיים בין חודש לשושנה וזוהי הדרגה שעוברת את החורף.



אייר 3 : בוגרים במנח אופייני (תמונה משמאלה ומרכז) עם כנפיים עם פס חום כהה לאורך שליל הכנף ו"חלון" בגוון בז' בקצתו וכתמים חומיים אפורים במרכז הכנף